

配合変化表

2022年10月 改訂

強心利尿剤

ジギラノゲン注0.4mg

〈日本薬局方 デスラノシド注射液〉

ネオクリティケア製薬株式会社

強心利尿剤
ジギラノゲン注0.4mg
〈日本薬局方 デスラノシド注射液〉

【組成・性状】

1. 組成

本剤は1管（2mL）中に下記成分を含む。

有効成分	デスラノシド	0.4 mg
添加物	エタノール	0.2 mL
	グリセリン	0.35 g

2. 性状

本剤は無色澄明の液で、pH及び浸透圧比は次のとおりである。

pH	5.0～7.0
浸透圧比 (生理食塩液に対する比)	エタノール、グリセリンを含有のため測定していない。

【pH変動試験】

1. 試験方法


(1) 試料

1管あるいは1瓶中の容量が10mL 以上の場合は10mLを試料とした。
1管あるいは1瓶中の容量が10mL以下の場合は、その容量を試料とした。

(2) 外観変化及び変化点pHあるいは最終pH


0.1mol/L塩酸溶液、0.1mol/L水酸化ナトリウム溶液を使用し、変化する場合には変化点pHと溶液量を記し、変化のない場合は、両溶液の10mL滴下時のpH（最終pH）を測定した。

2. 試験結果



○ 製品名

規格pH：5.0～7.0



【 配合変化試験 】

1. 検体

本剤1管（0.4mg/2mL）を検体とした。

2. 試験項目

(1) 外観

3. 試験方法

検体に対し他製剤（試験結果に示した配合量）を混合し、室温、散光下に24時間保存した。

4. 試験結果

自社での試験及び配合変化の文献〔注射薬配合変化早見（薬事新報社）他〕に基づいて、次項の配合変化表を作成した。

ジギラノゲン注 0.4mg 配合変化表

配糖体は強酸、アルカリ、酵素で分解しやすい。(局方、デスラノシド注射より)

(注) 外観変化欄の あり：外観変化がある なし：外観変化がない, 数字は配合後の保存時間

配合薬	配合量	外観変化	性状	備考
塩酸プロメタジン注	1mL	あり 0	結晶析出	
メチロン	2mL	あり 3	僅微黄白色	
ネオフィリン注	10mL	あり 6	アルカリ性	
KN3B	50mL	なし 24		
ニコリン	2mL	なし 10M TLC		
20% マンニトール注	100mL	なし 6		
5-FU 250mg	5mL	なし 6		+ブ20%100
5-FU協和250mg	5mL	なし 6		
D-マンニトール注射液		なし		
EL-3	500mL	なし 24		
EL-H	500mL	なし 24		
KN3A	50mL	なし 24		
L-メチオニン注100mg	2mL	なし 0.5		
アスパラカルシウム	10mL	なし 10M TLC		
アタラックスP	2mL	なし 10M TLC		
アデホスL 20mg	2mL	なし 6		
アデホスL コワ注 3号	20mg 2mL	なし 6		
アデラビン9号		なし		
アドナ(AC-17)注射液	10mg 2mL	なし 6		
アブシード注	5mL	なし 6		
アミカリック	500mL	なし 24		
アミノフィリン注	10mL	なし 0.5		
アミノレバン		なし		
アメリゾール注	1mL	なし 0.5		
アリナミン 10mg	2mL	なし 30M		
アリナミンF25		なし		
アリナミンF5		なし		
アリナミンF 50注	20mL	なし 6		
アリナミン注5mg	1mL	なし 1		
アルギメート	100mL	なし 24		
アルトフェッド注	500mL	なし 24		
アンナカ注 20%		なし 0.5		
イノシー 2%	10mL	なし 24 10M TLC		
インデラル 2mg	2mL	なし 10M TLC		
エホチール	1mL	なし 24		
エンドキサン	100mg DW6mL	なし 24		ジギラノゲンC注6mLに対して
カチーフN 10mg	1mL	なし 6		
キシリトール森下10%	500mL	なし 24		
キシリトール森下5%	500mL	なし 24		
クリニザルツB	500mL	なし 24		
グルコン酸カルシウム 注8.5%		なし 0.5		
ケイツー注 30mg	3mL	なし 72		
コンドロイチン注3%	2mL	なし 0.5		
サクシゾン注射用	1V	なし 6		
スルペラゾン静注用		なし		
セファメジン	1g	なし 6		+生食液100
セファランチン注5mg	2mL	なし 0.5		
ソリターT 3号	100mL	なし 6		
ソルラクトTMR	500mL	なし 24		
タチオン	200mg	なし 6		
チオ硫酸ナトリウム 注50%	2mL	なし 0.5		
デキストラン注	100mL	なし 1		
トランサミンS	1g 10mL	なし 6		
ニコリン注射液		なし		

配合薬	配合量	外観変化	性状	備考
ネオシネジン注5mg	1mL	なし0.5		
パントール注250mg	1mL	なし6		
パントール注射液500mg	2mL	なし72		
ビタミン注100mg	1mL	なし6		
ビタミンB1	1mL	なし1		
ビタミンB2	1mL	なし1		
ビタミンB6注50mg	1mL	なし0.5		
ビタミンC注100mg	1mL	なし0.5		
ビタミンK3注	1mL	なし0.5		
ビタメジン静注用	1V	なし6		
ピドキサル	1mL	なし10M TLC		
ピドキサル注10mg	1mL	なし6		
フィジオゾール3号	500mL	なし24		
フィジオゾール3号S	500mL	なし24		
フェジン	2mL	なし6		
ブドウ糖20%	20mL	なし3		
フトラフル	400mg 10mL	なし24		
フラビタン注射液	5mg	なし6		
プリンペラン注射液	2mL	なし6		
フルクトン20%	20mL	なし6		
フレミンS	1mL	なし10M TLC		
ヘルサンチン注射液10mg	2mL	なし6		
ペントレックス	250mg DW2mL	なし24		
ボスミン	1mL	なし10M TLC		
ポタコールR	50mL	なし24		
マイトマイシンS	2mg NS5mL	なし7		37°
マルトスー10	50mL	なし24		
マンニトール森下20%	500mL	なし24		
ミノマイシン	100mg DW5mL	なし24		
ミリスロール注		なし		
メイロン7%	20mL	なし6		
メタボリンG	1mL	なし1		
モリアミン	500mL	なし24		
モリアミン-2	500mL	なし24		
ラクテック	50mL	なし24		
ラクテックG	50mL	なし24		
ラシックス注20mg	2mL	なし6		
リングル液	100mL	なし1		
リンコシン	300mg 1mL	なし30		24°
リンコシン	600mg 2mL	なし24		
塩化カルシウム2%	20mL	なし1		
塩化ナトリウム液10%	20mL	なし0.5		
塩酸クロプロマジン注0.5%	5mL	なし0.5		
強力ネオミノファーゲンC	20mL	なし		
強力ビスラーゼ注10mg	1mL	なし1		
強力メタボリン注5mg	1mL	なし1		
強力モリアミンS	200mL	なし24		
水溶性プレドニン	20mg	なし6		
水溶性プレドニン	20mg	なし6		+ソリタT3 100
生理食塩液	100mL	なし24		
静注用キシロカイン注射液2%	5mL	なし5		
第一糖液20mg	100mL	なし6		
注射用メタホラゼ20mg	2mL	なし6		
低分子デキストラン注		なし		
低分子デキストラン糖	50mL	なし24		
低分子デキストラン糖注		なし		
葉酸注15mg	1mL	なし0.5		