

配合変化表

2022年10月 改訂

日本薬局方 ドパミン塩酸塩注射液

ドパミン塩酸塩点滴静注100mg 「KCC」

ネオクリティケア製薬株式会社

急性循環不全改善剤
ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」
〈日本薬局方 ドパミン塩酸塩注射液〉

【組成・性状】

1. 組成

本剤は1管（5mL）中に下記成分を含む。

有効成分	ドパミン塩酸塩	100mg
添加物	亜硫酸水素ナトリウム	5mg

2. 性状

本剤は無色澄明の水性注射液で、pH及び浸透圧比は次のとおりである。

pH	3.0～5.0
浸透圧比 (生理食塩液に対する比)	約0.7

【pH変動試験】

○ 試験方法

1. 試料

1管あるいは1瓶中の容量が10mL 以上の場合は10mLを試料とした。


1管あるいは1瓶中の容量が10mL以下の場合は、その容量を試料とした。

2. 外観変化及び変化点pHあるいは最終pH

0.1mol/L塩酸、0.1mol/L水酸化ナトリウム溶液を使用し、変化する場合には変化点pHと溶液量を記し、変化のない場合は、両試液の10mL滴下時のpH（最終pH）を測定した。

○ pH変動スケールの見方

例：



○ 試験結果

規格 pH	pH 変動 スケール														
3.0～5.0	pH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					←10				2.4→		黄変				
					1.27		3.71								8.82

ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」配合変化表

◎外観変化あり (sal.:生理食塩液, D.W.:注射用水)

製品名(メーカー名)	配合量	外観変化
アシクロビル点滴静注用250mg「アイロム」 (共和クリティケア)	250mg D.W.10mL	直 後 白 濁
アレビアチン注250mg (大日本住友)	250mg 5mL	直 後 白 濁
コンクライトCa液1mEq/mL ※販売中止 (ニプロファーマ)	0.5mol/L 20mL	直 後 帯 桃 色
サイレース静注2mg (エーザイ)	2mg 1mL	3時間後微白濁→6時間後混濁
ダラシンS注射液600mg (ファイザー)	600mg 4mL	1 時 間 後 結 晶 析 出
ダントリウム静注用20mg (オーファンパシフィック)	20mg 60mL	直 後 沈 殿 析 出
ファンギゾン注射用50mg (クリニジェン)	50mg D.W.5mL	直 後 白 濁
ラボナール注射用0.5g (ニプロES)	500mg D.W.20mL	直 後 白 濁
5-FU注250mg (協和キリン)	250mg 5mL	2 4 時 間 後 黒 褐 色
アデホス-Lコーワ注40mg (興和)	40mg 2mL	3 時 間 後 帯 桃 色
サクシゾン注射用300mg (武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田)	300mg 3mL	2 4 時 間 後 着 色 黄 色
シオマリン静注用1g (塩野義)	1g D.W.10mL	2 4 時 間 後 増 色
重ソー注「小林」(共和クリティケア) ※販売中止	20mL	6 時 間 後 黒 褐 色
ソリタックス-H輸液 (エイワイファーマ=陽進堂)	100mL	2 4 時 間 後 色 調 変 化
ダカルバジン注用100 (協和キリン=アスペン)	100mg D.W.10mL	2 4 時 間 後 着 色 淡 黄 色
チエナム点滴静注用0.5g (MSD)	0.5g 100mL	2 4 時 間 後 微 褐 色
注射用サイメリン100mg (ニプロES)	100mg sal.10mL	2 4 時 間 後 着 色 淡 赤 橙 色
デトキソール静注液2g (日医工)	10% 20mL	2 4 時 間 後 黒 褐 色
ハイピリドキシ注30mg ※販売中止 (共和クリティケア)	30mg 1mL	9 時 間 後 沈 殿
フェジン静注40mg (日医工)	40mg 2mL	2 4 時 間 後 着 色 黒 濁
フェロン注射用100万 (東レ=第一三共)	100万U sal.1mL	2 4 時 間 後 浮 遊 物
フトラフル注400mg (大鵬薬品)	400mg 10mL	3 時 間 後 黒 褐 色
フルマリン静注用1g (塩野義)	1g D.W.10mL	2 4 時 間 後 淡 黄 色
ベストコール静注用1g (武田テバ薬品=武田)	1g 5mL	3 時 間 後 黒 褐 色
メチロン注25% (第一三共) ※販売中止	25% 2mL	6 時 間 後 着 色 黄 色
ラシックス注20mg (サノフィ=日医工)	20mg 2mL	6 時 間 後 結 晶 析 出

◎外観変化なし (sal.:生理食塩液, D.W.:注射用水)

製品名(メーカー名)	配合量	
EL-3号輸液(エイワイファーマ=陽進堂)	500mL	
KN3号輸液(大塚工場=大塚製薬)		
アクトシン注射用300mg(アルフレッサファーマ)	300mg	5mL
アザクタム注射用1g(エーザイ)	1g	D.W.10mL
アスペノン静注用100(バイエル)	100mg/10mL	GL 5% 500mL
アタラックス-P注射液(50mg/mL)(ファイザー)	50mg	1mL
アデラピン9号注1mL(マイラン=ファイザー)	1mL	
アドナ注(静脈用)100mg(ニプロES)	100mg	20mL
アトニン-O注5単位(あすか製薬=武田)	5U	1mL
アドリアシン注用10(アスペン)	10mg	D.W.5mL
アナフラニール点滴静注液25mg(アルフレッサファーマ)	25mg	2mL
アネキセート注射液0.5mg(アスペン)	0.5mg	5mL
アバカ注(共和クリティケア) ※販売中止	10mL	
アプレゾリン注射用20mg(サンファーマ=田辺三菱)	20mg	D.W.1mL
アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」(日医工)	100mg	1mL
アミカリック輸液(テルモ) ※販売中止	500mL	
アミサリン注100mg(アルフレッサファーマ)	200mg	2mL
アミノトリパ1号輸液(大塚工場) ※販売中止	1袋	
アミノトリパ2号輸液(大塚工場) ※販売中止	1袋	
アミノフリード輸液(大塚工場) ※販売中止	500mL	
アミノレバン点滴静注(大塚工場=大塚製薬)	50mL	
	200mL+GL 70% 350mL	
アリナミンF25注(武田テバ薬品=武田)	25mg	10mL
アルギメート点滴静注10%(エイワイファーマ=EAファーマ)	200mL	
アルツ関節注25mg(生化学=科研)	25mg	2.5mL
アレリックス6mg注(サンド) ※販売中止	6mg	2mL
注射用イホマイド1g(塩野義)	1g	D.W.5mL
インデラル注射液2mg(アストラゼネカ)	2mg	2mL
イントラリポス輸液10%(大塚工場=大塚製薬)	10%	500mL
ウロキナーゼ静注用6万単位「ベネシス」(田辺三菱) ※販売中止	6000U	D.W.5mL
エスロンB注(共和クリティケア)	500mL	
エホチール注10mg(サノフィ)	10mg	1mL
エルネオパ1号輸液(大塚工場) ※販売中止	1500mL	
エルネオパ2号輸液(大塚工場) ※販売中止	1500mL	
エレメンミック注(エイワイファーマ=陽進堂)	2mL	
注射用エンドキサン100mg(塩野義)	100mg	D.W.5mL
オザグレルNa点滴静注20mg「IP」(共和クリティケア)	20mg	D.W.5mL
オンコピン注射用1mg(日本化薬)	1mg	D.W.10mL
カシワドール静注(共和クリティケア)	20mL	
ガスター注射液20mg(LTL)	20mg	sal.20mL
ガストロゼピン注(BIS-日本ベーリンガー=エッセス) ※販売中止	10mg	2mL
カルチコール注射液8.5% 5mL(日医工)	5mL	

製品名(メーカー名)	配合量	
静注用キシロカイン2%(アスペン)	100mg	5mL
キロサイド注40mg(日本新薬)	40mg	2mL
グリセノン注(共和クリティケア) ※販売中止		200mL
グルアセト35注(共和クリティケア)		500mL
KCL補正液1mEq/mL(大塚工場=大塚製薬)	1mol/L	20mL
ケタラール静注用200mg(第一三共プロファーマ=第一三共)		10mL
ゲンタシン注60(高田)	60mg	1.5mL
コンベルビー注(共和クリティケア) ※販売中止		10mL
サヴィオゾール輸液(大塚工場=大塚製薬)		500mL
ザンタック注射液50mg(GSK)	50mg	2mL
サンディミュン点滴静注用250mg(ノバルティス)	250mg	5mL
サンラビン点滴静注用200mg(旭化成ファーマ)	200mg	sal.20mL
サンリズム注射液50(第一三共)	50mg	5mL
シーパラ注(高田)		2mL
ジギラノゲン注0.4mg(共和クリティケア)	0.4mg	2mL
ジゴシン注0.25mg(太陽ファルマ)	0.25mg	1mL
シチコリンS注「小林」(共和クリティケア) ※販売中止	250mg	2mL
水溶性ハイドロコトロン注射液500mg(日医工)	500mg	10mL
スミフェロン注DS300万IU(大日本住友)	300万U	1mL
セスデン注7.5mg(ニプロES)	7.5mg	1mL
セファランチン注10mg(メディサ=化研生薬)	5mg	1mL
プロアクト静注用1g(サノフィ) ※販売中止	1g	D.W.20mL
セフメタゾン静注用1g(アルフレッサファーマ)	1g	D.W.10mL
セレネース注5mg(大日本住友)	5mg	1mL
ソセゴン注射液30mg(丸石)	30mg	1mL
ソリュージェンF注(共和クリティケア=ニプロ=光)		500mL
ソリュージェンG注(共和クリティケア=ニプロ)		500mL
ソル・コーテフ注射用100mg(ファイザー)	100mg	2mL
ソル・メドロール静注用40mg(ファイザー)	40mg	1mL
ソルアセトD輸液(テルモ)		250mL
ソルアセトF輸液(テルモ)		500mL
ソルデム1輸液(テルモ)		200mL
ソルデム3A輸液(テルモ)		200mL
ソルデム3AG輸液(テルモ)		500mL
ダウノマイシン静注用20mg(Meiji Seika)	20mg	D.W.5mL
タガメット注射液200mg(大日本住友)	200mg	2mL
タチオン注射用200mg(長生堂=日本ジェネリック)	600mg	D.W.5mL
低分子デキストランL注(大塚工場=大塚製薬)		50mL
テラプチク静注45mg(エーザイ)	45mg	3mL
ドパストン静注25mg(大原)	25mg	10mL
ドパミン点滴静注100mg「アイロム」(共和クリティケア)	100mg	D.W.10mL
ドブポン注0.1%シリンジ(テルモ=協和キリン)		50mL
トブラシン注60mg(東和薬品=ジェイドルフ)	60mg	1.5mL
ドブラム注射液400mg(キッセイ)	400mg	20mL
トラサムロンS注「小林」(共和クリティケア)	1g	10mL
トリフリード輸液(大塚工場=大塚製薬)		500mL
ドルミカム注射液10mg(丸石)	10mg	2mL

製品名(メーカー名)	配合量	
トロペロン注4mg(アルフレッサファーマ=田辺三菱=吉富薬品)	4mg	2mL
ドロレプタン注射液25mg(アルフレッサファーマ)	25mg	1mL
ナイクリン注射液50mg(トーアエイヨー=アステラス)	50mg	1mL
ニトロール注5mg(エーザイ)	5mg	10mL
強カネオミノファーゲンシー静注20mL(ミノファーゲン=EAファーマ)		20mL
ノルアドリナリン注1mg(アルフレッサファーマ)	1mg	1mL
パニマイシン注射液100mg(Meiji Seika)	100mg	D.W.5mL
パパペリン塩酸塩注射液40mg「日医工」(日医工)	40mg	1mL
ハルトマン液「コバヤシ」(共和クリティケア)		500mL
ハルトマンD液「小林」(共和クリティケア)		500mL
ハルトマン-G3号輸液(アイロム)		500mL
パンテノール注100mg「KCC」(共和クリティケア)	100mg	1mL
パンテチン注10%「小林」(共和クリティケア)	200mg	2mL
ピーエヌツイン-1号輸液(エイワイファーマ=陽進堂)		1袋
ピーエヌツイン-2号輸液(エイワイファーマ=陽進堂)		1袋
ピーエヌツイン-3号輸液(エイワイファーマ=陽進堂)		1袋
ビクシリン注射用0.5g(Meiji Seika)	0.5g	D.W.5mL
ビソルボン注4mg(サノフィ)	4mg	2mL
ビタC注25%(共和クリティケア)	500mg	2mL
ビタメジン静注用(第一三共)	1V	D.W.5mL
ビーフリード輸液(大塚工場=大塚製薬)		500mL
ファーストシン静注用1g(武田テバ薬品=武田)	1g	sal.100mL
ファルモルビシン注射用10mg(ファイザー)	10mg	D.W.5mL
ファルモルビシンRTU注射液10mg(ファイザー)	10mg	5mL
フィジオ35輸液(大塚工場=大塚製薬)		500mL
フィジオ70輸液(大塚工場=大塚製薬)		500mL
フィジオ140輸液(大塚工場=大塚製薬)		500mL
注射用フィルデシン1mg(日医工)	1mg	
注射用フサン10(日医工)	10mg	D.W.10mL
ブスコバン注20mg(サノフィ)	20mg	1mL
フラグミン静注(ファイザー)	4000低分子ヘパリンU	4mL
プラスアミノ輸液(大塚工場=大塚製薬)		50mL
フラビタン注射液10mg(トーアエイヨー=アステラス)	10mg	1mL
プリンペラン注射液10mg(日医工)	10mg	2mL
フルクトラクト注(大塚工場=大塚製薬)		500mL
ブレオ注射用15mg(日本化薬)	15mg	D.W.5mL
水溶性プレドニン20mg(シオノギファーマ=塩野義)	20mg	2mL
プロスタンディン注射用20μg(丸石)	20μg	sal.5mL
プロタノールL注0.2mg(興和)	0.2mg	1mL
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(持田)	100mg	10mL
フロリドF注200mg(持田)	200mg	20mL
ヘスパンダー輸液(フレゼニウスK=大塚工場=大塚製薬)		500mL
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」(持田)	5000IU	5mL
ヘパリンNa注10万単位/100mL「フソー」(扶桑) ※販売中止	1000U	1mL
ペルサンチン静注10mg(日本ベーリンガー) ※販売中止	10mg	2mL
ヘルベッサー注射用10(田辺三菱)	20mg	sal.20mL
ペントシリン注射用2g(富山フィルム富山化学)	1g	D.W.5mL
ポスミン注1mg(第一三共)	1mg	1mL

製品名（メーカー名）	配合量	
ポラミン注5mg（高田）	5mg	1mL
マイトマイシン注用2mg（協和キリン）	2mg	D.W.5mL
静注用マグネゾール20mL（あすか製薬＝武田）		20mL
マルトス輸液10%（大塚工場＝大塚製薬）		50mL
ミノマイシン点滴静注用100mg（ファイザー）	100mg	D.W.5mL
ミラクリッド（持田）	5万U	sal.5mL
ミリスロール注5mg/10mL（日本化薬）	5mg	10mL
ミルリーラ注射液10mg（アステラス）	10mg	10mL
メイセリン静注用1g（Meiji Seika）	1g	sal./D.W.20mL
メキシチール点滴静注125mg（太陽ファルマ）	125mg	5mL
注射用メソトレキセート5mg（ファイザー）	5mg	D.W.5mL
メチコバル注射液500μg（エーザイ）	500μg	1mL
モダシン静注用1g（GSK）	1g	D.W.10mL
モリヘパミン点滴静注（エイワイファーマ＝EAファーマ）		500mL
ユニカリックN輸液（テルモ）※販売中止		1000mL
ラクテック注（大塚工場＝大塚製薬）		500mL
ラステット注100mg/5mL（日本化薬）	100mg	5mL
リスモダンP静注50mg（サノフィ）	50mg	5mL
リンコシン注射液600mg（ファイザー）	600mg	2mL
リンデロン注2mg(0.4%)（シオノギファーマ＝塩野義）	2mg	0.5mL
注射用ルシドリール注250mg（共和薬品）※販売中止	250mg	D.W.10mL
ルネトロン注射液0.5mg（第一三共）	0.5mg	1mL
レプチラーゼ注2単位（東菱）	2U	2mL
レペタン注0.3mg（大塚製薬）	0.3mg	1.5mL
レンチナン静注用1mg「味の素」（EAファーマ）	1mg	D.W.2mL
ロイコン注射液20mg（大原）	20mg	2mL
ロイナーゼ注用5000（協和キリン）	5000KU	D.W.5mL
ロセフィン静注用1g（太陽ファルマ）	1g	D.W.10mL
ロピオン静注50mg（科研）		5mL
ロルファン注射液1mg（武田テバ薬品＝武田）	1mg	1mL
ワソラン静注5mg（エーザイ）	5mg	2mL

注）製品名及びメーカー名は保険薬事典の令和2年8月版（じほう発行）に準拠した。