

配合変化表

2022年10月 作成

5-HT₃受容体拮抗型制吐剤

グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」

ネオクリティケア製薬株式会社

配合変化試験結果

配合剤	配合量	試験項目	混合直後	1時間後	6時間後	24時間後
ガスター注射液20mg	2mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		pH	5.65	5.66	5.67	5.72
		残存率(%)	100.00	100.15	99.17	98.52
プリンペラン注射液10mg	2mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		pH	5.05	5.04	5.04	5.02
		残存率(%)	100.00	99.56	98.79	98.00
デカドロン注射液(8mg/2mL)	4mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		pH	6.91	6.82	6.80	6.77
		残存率(%)	100.00	100.45	99.57	98.37
ガスター注射液20mg プリンペラン注射液10mg	2mL 2mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		pH	5.58	5.58	5.58	5.56
		残存率(%)	100.00	98.09	99.44	99.02
ガスター注射液20mg デカドロン注射液(8mg/2mL)	2mL 4mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		pH	6.65	6.64	6.64	6.62
		残存率(%)	100.00	99.99	100.20	99.32
プリンペラン注射液10mg デカドロン注射液(8mg/2mL)	2mL 4mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		pH	6.63	6.51	6.48	6.44
		残存率(%)	100.00	100.72	100.94	100.42
ガスター注射液20mg プリンペラン注射液10mg デカドロン注射液(8mg/2mL)	2mL 2mL 4mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		pH	6.55	6.55	6.55	6.52
		残存率(%)	100.00	100.17	98.79	98.02